



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โทรศัทพ์ที่ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198
ข่าวสาร เพื่อการดูแลสุขภาพ

ฉบับที่ 2/2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2559

เตือน โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วตายทุกราย

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แนะนำ พาสัต์ว์เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์ที่มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าที่พบมากที่สุด คือ สุนัข รองลงมา ได้แก่ แมว ม้า ลิง วัว ควาย สัตว์แพะจำพวกหนู กระรอก เตือนผู้ปกครองอย่าให้บุตรหลานไปเล่น หรือคลุกคลีกับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ เพราะอาจถูกกัด หรือข่วนได้ เจ้าของสุนัขและแมว ควรพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สถานการณ์ระดับประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 – 14 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยพิษสุนัขบ้า จำนวน 13 ราย จาก 9 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.30 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดเรียงลำดับ คือ 55-64 ปี (30.77%) อายุมากกว่า 65 ปี (23.08%), 35-44 ปี (15.38%) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 84.6 พม่าร้อยละ 15.4 ส่วนใหญ่ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38.5 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 30.8 เกษตรกร ร้อยละ 15.4 ในขณะที่มีรายงาน พบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัข 20 จังหวัด โดยจังหวัดที่มีการตรวจพบเชื้อมากที่สุด ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ และชลบุรี สำหรับจังหวัดพะเยา มีรายงานผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละประมาณ 3,000 ราย สำหรับปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559 มีผู้มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละประมาณ 328 ราย

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช กล่าวต่อไปอีกว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีละประมาณ 55,000 คน ส่วนใหญ่ ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วน แล้วไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างรวดเร็วและครบถ้วน กลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ถูกสุนัขกัดมากที่สุด เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ชา เจ็บเสียว หรือ ปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด อาการของผู้ป่วยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือแบบคลุ้มคลั่ง อาจมีอาการกระวนกระวาย ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ประสาทหลอน อาจมีชัก หายใจหอบ หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด และกลุ่มที่ 2 คือ แบบอัมพาต เป็นอาการที่พบได้น้อย โดยมีอาการอัมพาตของแขน ขา พูดไม้ซัด น้ำลายมาก มีอาการกลัวน้ำ กลัวลม หลังแสดงอาการจะอยู่ได้นานกว่าแบบคลุ้มคลั่ง และจะเสียชีวิตในที่สุด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เน้นย้ำ โรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันได้ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุ 2-4 เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปี ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้าย ด้วยคำแนะนำ 5 ย. คือ **1. อย่าแหย่** ให้สุนัข โหมโ โกรธ **2. อย่าเหยียบ** หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ **3. อย่าแยก** สุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า **4. อย่าหยิบ** ชามข้าว หรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ **5. อย่ายุ่ง** หรือเข้าไปใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ